



Zajisti:

- *monitoring pacienta dle doporučených postupů ošetrovatelské péče daného ZZ, sledování a záznam monitorovaných parametrů a změn, které by mohly poukazovat na riziko zhoršení klinického stavu*
- *monitoraci vitálních funkcí dle ordinace lékaře a včasné oznámení abnormálních hodnot lékaři*
- *plnění ordinace lékaře – podávání léků, tlumení bolesti, správné dávkování pomocí infuzních pump a lineárních dávkovačů, aplikování oxygenoterapie dle stavu pacienta, u epidurální analgezie pomocí EDA katetru sledovat zavedení, funkčnost tzn. analgetický efekt, pocit brnění nebo motorické blokády dolních končetin, sledovat TK – prevence hypotenze*
- *kontrolování laboratorních hodnot, posttransfuzních reakcí, po operaci riziko hypovolemického šoku, riziko tromboembolické nemoci a kontrolování operační rány*
- *dle stavu a potřeby pacienta – zajištění vylučování (mikce, defekace), odsávání z dýchacích cest, kontrolování drénů, sond (žaludeční, jejunální) a dalších vstupů*

Zajisti:

- *dle potřeby odsátí sekretu z horních nebo dolních cest dýchacích*
- *odpočinek a zvýšenou polohou pacienta 15 - 30 minut před podáváním stravy a po skončení krmení ponechat v této poloze po dobu 15 – 30 minut*
- *při krmení NGS komunikovat s pacientem o jeho subjektivních pocitech - nevolnost, plnost, bolesti břicha, křeče*
- *při oslabení jedné části obličeje vkládat stravu do nepostižené strany úst a pečlivě kontrolovat stav dutiny ústní před ukončením krmení*
- *v případě dysfagie neurogenního původu, zahušťovat tekutiny na konzistenci pudinku*
- *podávat stravu po menších porcích a přiměřené teploty (ne studenou ani horkou), nabádat k důkladnému rozmělnění potravy*
- *v průběhu stravování příjem tekutin*
- *v průběhu krmení dopřát dostatek času a nespěchat*
- *pacienta opustit až po důsledné kontrole a pečlivém vyčištění dutiny ústní od zbytků stravy*
- *sledovat škytání u pacienta s poruchou pasáže, včasné zavedení žaludeční sondy, kontrola správného zavedení žaludeční sondy, sledování množství, barvy a příměsí žaludečního obsahu, zvýšená poloha pacienta v polosedě*

